

上部消化管内視鏡検査に関する説明と同意書

【 目的・方法 】

- 食道、胃、十二指腸の疾患を診断するための検査で、経口または経鼻的に内視鏡を挿入し、空気で膨らませながら食道・胃・十二指腸を観察します。**安定剤使用時は、経口的に内視鏡を挿入します。**
- 初めて検査を受ける方・歯磨きで嘔吐反射が出やすい方で**運転予定のない方は安定剤の使用をお勧めします。**
- 医師の指示がない限り、抗血栓薬（血液をサラサラにする薬）などは継続したまま行います。
- 必要に応じて粘膜組織の採取や色素撒布を行います。
- 検査時に病変からの出血や異物認めた場合には、止血術や異物除去術などの処置を行うことがあります。
- 強い咽頭反射や合併症が起こった等医師が継続困難と判断した場合、検査を中止することもあります。
- 前処置はのど（鼻からの場合は鼻とのど）にスプレーを噴霧し麻酔します。

全身・局所麻酔薬、ヨード（CTの造影剤やイソジン）アレルギーのある方は事前にお申し出ください。

【 合併症（併発症）】

すべての医療行為にはリスクがあり、ある一定の確率で合併症が起こります。

本検査においても下記の合併症が報告されています（直近の消化器内視鏡学会全国調査）が、上部消化管内視鏡検診による癌の発見率は一般に0.5～0.9%と言われており、病気の怖さを考えれば、検査を受けるメリットの方がはるかに大きいと言えます。

- ◎ 内視鏡による消化管粘膜の出血・穿孔 発生頻度：0.005% (2万人に1件)
- ◎ 検査に伴うショック（血圧低下等）、薬剤アレルギー等 発生頻度：0.004% (2万5千人に1件)
- ◎ 高齢者などでは、唾液の誤嚥により、遅れて肺炎を起こすことがあります。
- ◎ 経鼻的に検査をした場合、持続する鼻腔出血や粘膜の損傷をきたすこともあります。

上記の合併症が起きた際は適切な処置を行いますが、入院が必要と判断した場合は入院施設へ移送いたします。その他、マウスピースを強く噛むことで、ぐらついている歯が折れたり欠けたりすることがあります。

下記の **いずれかにレ点** を入れ、ご署名ください。

- 説明文に同意し、経口的 に検査を受けることを希望します。
（安定剤使用時は、経口的な挿入になります）
- 説明文に同意し、経鼻的 に検査を受けることを希望します。
- 同意しません。

令和 年 月 日 患者もしくは代理人署名 _____

三島 利之 三宅 直人

上杉胃腸科内科クリニック

内視鏡検査・治療における 安定剤使用に関する説明と同意書

【 目的・方法 】

内視鏡検査に伴う痛みや不安を感じる程度にはかなり個人差がありますが、次に該当する方は、安定剤の使用によって苦痛が少なく検査を受けていただける場合があります。方法は、検査時に静脈から薬剤を注射します。効き方に個人差はありますが、眠っている間に検査が終了している方がほとんどです。

- ◎ 初めて検査を受けられる方・不安の強い方で、当日中の運転予定がない方
- ◎ 以前の検査で苦痛を伴うことがあり、今回は少しでも楽に検査を受けたい方
- ◎ 痛みを感じやすい方、嘔吐反射の強い方（歯磨きでも嘔吐反射が出る方等）

【 合併症 】

すべての医療行為にはリスクがあり、ある一定の確率で合併症が起こります。

この方法でも呼吸抑制・低酸素血症・呼吸停止などが報告されています。直近の消化器内視鏡学会全国調査（約1200万件）では安定剤による合併症は178例（うち死亡例は3例）報告されています。この他、予期せぬ合併症が発生することが稀にありますが、その際は適切な処置（必要時入院施設へ移送）を行います。

【 注意事項 】

- 当日中（夜間も含む）は、車・バイク・自転車などの運転は禁止になります。
万が一事故を起こした場合は自己責任となり、当院では責任を負いかねます。
- 安定剤を使用すると眠気・ふらつきが出現するため、最低30分以上は院内で休んでいただきます。
（お会計のご案内までは、平均すると予約時間から2時間ほど要します）
- 安定剤の効果は個人差がありますが、転倒の危険性が高まり判断力や記憶力の低下がみられます。
また、時間とともに弱くなっていきますが、自覚がなくとも当日中はずっと続いているとお考えください。
- 安定剤を使用する場合、検査後に重大な判断を要する仕事もお控えください。
- 妊娠・授乳中の方、心臓・肺・肝臓の機能が弱い方等、場合によっては使用できない場合があります。

下記の **いずれかにレ点** を入れ、ご署名ください。

- 安定剤の使用を希望し、本日中の運転はいたしません。
- 本日中に 運転予定がある ため、安定剤の使用を希望しません。
- 本日中に 運転予定はない が、安定剤の使用を希望しません。

令和 年 月 日 患者もしくは代理人署名 _____

三島 利之 三宅 直人 上杉胃腸科内科クリニック